



### **Neposielajte svoje dieťa do školy, ak nastane ktorákoľvek z nasledujúcich situácií.**

Ak má vaše dieťa:

- teplotu 38 °C alebo viac
- akékoľvek iné bežné príznaky koronavírusu, napr. nový kašeľ, stratu chuti alebo čuchu alebo ich zmenu, dychovú nedostatočnosť
- ak bolo v blízkom kontakte s osobou, ktorá mala pozitívny výsledok testu na koronavírus
- bývalo s osobou, ktorá je chorá a môže mať koronavírus

Musíte:

1. Izolujte svoje dieťa. Znamená to, že má zostať doma a čo možno najviac sa úplne vyhýbať ostatným ľuďom. Vaše dieťa musí odísť z domu len na absolvovanie testu alebo návštevu všeobecného lekára.
2. Zatelefonujte svojmu všeobecnému lekárovi. Poradí vám, či vaše dieťa potrebuje test na koronavírus.
3. Každá osoba, s ktorou vaše dieťa býva, musí taktiež obmedziť svoj pohyb a to aspoň dovtedy, pokiaľ vášmu dieťaťu neurčí všeobecný lekár diagnózu alebo kým dieťa neobdrží výsledok testu na koronavírus. Znamená to, že nemôžete ísť do školy, starostlivosti o dieťa alebo do práce.
4. Príznaky dieťaťa liečte doma.

### **Ak sa v škole u žiaka objavia príznaky COVID-19, treba dodržať nasledujúci postup:**

- Okamžite treba kontaktovať rodiča/opatrovníka.
- Ihneď treba kontaktovať riaditeľa alebo jeho zástupcu a žiaka treba odvieŕať do izolačnej miestnosti po izolačnej trase, pričom treba dodržať najmenej 2 m odstup od osoby s príznakmi a zabezpečiť, aby ostatní dodržali aspoň 2 m odstup od žiaka s príznakmi. Ak nie je možné dodržať vzdialenosť 2 m, zamestnanec starajúci sa o žiaka musí mať zakrytú tvár alebo nasadené rúško. Rukavice sa nemajú používať, pretože vírus neprechádza pokožkou.
- Žiak musí mať rúško po celý čas a musí počkať v \*izolačnej miestnosti.
- Zatiaľ čo dieťa čaká na odchod domov, musí sa o neho náležite starať zamestnanec. Ak žiak potrebuje ísť na toaletu, treba ho nasmerovať na samostatnú toaletu, ktorá sa má po použití zamknúť a vyčistiť. Ak chce žiak zavolať svojim rodičom, aby získal ich podporu, treba mu to umožniť. Po opustení izolačného priestoru a toalety sa tieto musia vyčistiť a kontaktné miesta vydezinfikovať.

\*Vyhradeným izolačným priestorom v budove školy je zasadacia miestnosť. Ak sa príznaky COVID-19 objavia u viac ako jednej osoby, učebňa poslúži ako druhá izolačná miestnosť. Vyhradená izolačná oblasť je za zatvorenými dverami a oddelene od ostatných zamestnancov a žiakov.

## Povinnosti rodiča/opatrovníka:

- Rodič/opatrovník zariadi vyzdvihnutie žiaka. Nesmie sa použiť hromadná doprava.
- Zavolajte všeobecnému lekárovi svojho dieťaťa, povedzte mu o príznakoch dieťaťa a lekár vám povie, čo treba urobiť.

### Ak vám všeobecný lekár **neodporučí** test

- Vaše dieťa musí zostať doma 48 hodín po ustúpení príznakov.

### Ak vám všeobecný lekár **odporučí** test











- Ak všeobecný lekár dieťaťa vyhodnotí príznaky ako konzistentné s infekciou Covid-19 a osobu pošle na test, od tohto momentu sa osoba stáva podozrivým prípadom na Covid-19.
- V tomto čase je nutné, aby všetkých súrodencov vyzdvihol zo školy ich rodič alebo opatrovník.

## Ak vaše dieťa podstúpi test a má pozitívny výsledok

Po potvrdení prípadu sa zdravotnícky úradník priamo spojí so školou, podľa potreby ju informuje o potvrdenom prípade a vypracuje posúdenie ohrozenia verejného zdravia, aby stanovil ďalšie kroky a odporúčania.

## Ak vaše dieťa podstúpi test a má negatívny výsledok (výsledok „nezistený“)

Ak test nezistí žiadne dôkazy o prítomnosti vírusu Covid-19, dieťa musí zostať doma len dovtedy, pokiaľ sa necíti po zdravotnej stránke dostatočne dobre na návrat do školy (pokiaľ orgán HSE vyslovene nepožiadá inak). **Pred návratom do školy musia predovšetkým všetky príznaky vymiznúť na 48 hodín.** Ďalší súrodenci, ktorí nemajú príznaky sa môžu vrátiť do školy hneď, ako rodič, opatrovník alebo zamestnanec školy obdrží negatívny výsledok testu.

Symptoms	Coronavirus <small>Symptoms range from mild to severe</small>	Cold <small>Gradual onset of symptoms</small>	Flu <small>Abrupt onset of symptoms</small>
 Fever	Common	Rare	Common
 Cough	Common* (Usually Dry)	Mild	Common* (Usually Dry)
 Fatigue	Sometimes	Sometimes	Common
 Aches and Pains	Sometimes	Common	Common
 Sore Throat	Sometimes	Common	Sometimes
 Headaches	Sometimes	Rare	Common
 Shortness of Breath	Sometimes	No	No
 Runny or Stuffy Nose	Rare	Common	Sometimes
 Diarrhoea	Rare	No	Sometimes for Children
 Sneezing	No	Common	No